

MS Symptomen in Europa

Resultaten van de IMSS enquête

P. Feys¹, P. Moghames², E. Kasilingam²,
R. King³, T. Manacorda⁴, M. Fonseca⁵,
E. Rogan², K. Notas⁶, D. Kos^{7,8}


Inleiding

We voeren in Europa onderzoek naar hoe mensen met MS hun symptomen ervaren en hoe ze ermee omgaan. Met het Europees initiatief "Impact van Multiple Sclerose Symptomen (IMSS)" willen we (on)gelijkheden identificeren, zorgtrajecten verbeteren en revalidatieresultaten versterken. Dit alles met het doel om mensen met MS de uitgebreide ondersteuning te kunnen bieden die ze nodig hebben.

Methode

Het European Multiple Sclerosis Platform (EMSP) heeft samen met 24 nationale MS-verenigingen en MS-experts uit heel Europa de IMSS-enquête opgestart.

De enquête was beschikbaar in de nationale talen van de deelnemende landen, volledig anoniem en online toegankelijk. Ze werd uitgevoerd van mei tot augustus 2023.



Belgische steekproef (n=565 personen met MS)

Europese steekproef (n=17.151 personen met MS)



Conclusies

Een vroege diagnose is belangrijk:
te veel mensen hebben te lang moeten wachten

Gemiddeld zat er **2,8 jaar** tussen de eerste symptomen en het stellen van de diagnose.

Een vroegtijdige diagnose van MS is cruciaal voor het tijdig starten van een behandeling, het vertragen van de ziekteprogressie en het behouden van de levenskwaliteit.

efficiënte zorg voor MS vraagt een **multidisciplinaire aanpak**

5 gemiddeld vijf zorgprofessionals zijn betrokken bij zorg en behandeling

68% vertelt dat zorgprofessionals samenwerken

MS-Liga Vlaanderen

emsp EUROPEAN MULTIPLE SCLEROSIS PLATFORM

IMSS

Met steun van MS-Liga Vlaanderen

Gegevens auteurs

- ¹ UHasselt, REVAL Rehabilitation Research Center, Hasselt, Belgium,
- ² European Multiple Sclerosis Platform (EMSP), Brussels, Belgium
- ³ Multiple Sclerosis International Federation (MSIF), London, United Kingdom
- ⁴ Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Research in public health and policy, Genova, Italy
- ⁵ Portuguese Society of Multiple Sclerosis, Research and Innovation Department, Lisbon, Portugal
- ⁶ Greek Multiple Sclerosis Society, Thessaloniki, Greece
- ⁷ KU Leuven, Department of Rehabilitation Research, Leuven, Belgium
- ⁸ National MS Center, Rehabilitation Research, Melsbroek, Belgium

daphne.kos@mscenter.be

Steekproef: 17.151 personen met MS uit 22 landen (zie figuur)

- Gemiddelde leeftijd bij het begin van symptomen: $30,7 \pm 10,0$ jaar
- Gemiddelde leeftijd bij diagnose: $34,1 \pm 10,3$ jaar
- Problemen met levenskwaliteit: 34%

In België hebben 565 personen met MS deelgenomen

Resultaten

Gebruik van zorgverleners door personen met MS in Europa (n=17.151) (%)

